




PET_____
FIRST+AID

Manuel de poche



NOTES DE TERRAIN

Radio Systems Corporation, 10427 Petsafe Way
Knoxville, TN 37932. Copyright 2021©Radio Systems
Corporation. Tous droits réservés.

www.kurgo.com | info@kurgo.com | 00 800 1818 2020

CONTENU DE LA BOÎTE

Introduction	4
Fréquence cardiaque et pouls	4
Pouls au repos	4
Fréquence cardiaque	5
Fréquence respiratoire	5
Températures normales	5
Manipulation	5
Muselière	5
Transport	7
Techniques	7
RCR	7
Urgences	9
Morsures	9
Saignements	10
Ballonnements	11
Brûlures	11
Étouffement	12
Déshydratation	13
Engelures	14
Coup de chaleur	14
Hypothermie	15
Blessure	15
Empoisonnement	17
Choc	18
Blessure traumatique	18
Informations d'urgence	21
Numéros de téléphone importants	Quatrième de couverture

Toutes les procédures de soins d'urgence décrites dans ce livre s'appuient sur les directives vétérinaires actuelles. Les procédures peuvent changer au fil du temps et il est de la responsabilité du lecteur de se tenir informé de ces changements. Kurgo n'accepte aucune responsabilité pour les blessures ou les dommages résultant de l'utilisation des informations présentées ici.

INTRODUCTION

Chaque animal de compagnie est unique. Il est essentiel de savoir ce qui est normal pour votre animal afin de reconnaître les comportements anormaux. Apprenez à reconnaître la température, la fréquence respiratoire, le rythme cardiaque et le pouls normaux de votre animal. Ces signes vitaux seront d'une importance cruciale en cas d'urgence.


FRÉQUENCE CARDIAQUE ET POULS

Pouls au repos

Intérieur de la cuisse (A)

- L'intérieur de la cuisse est le plus facile des trois endroits à palper pour trouver un pouls.
- Allongez l'animal sur un côté.
- Soulevez doucement la patte arrière située au-dessus pour l'éloigner de la patte arrière située en dessous.
- En appuyant légèrement, placez votre index et votre majeur à l'endroit où la patte rencontre le torse. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre patte.
- Cherchez un pouls et comptez pendant 60 secondes.

Soulevez la patte arrière située au-dessus pour l'éloigner de la patte arrière située en dessous



Pattes avant – juste en dessous du carpe (B)

- Avec votre animal assis ou allongé, localisez la zone juste au-dessus du coussin central sous l'une des pattes avant.
- Placez votre index et votre majeur dans cette zone et cherchez un pouls.
- Comptez pendant 60 secondes.

Pattes postérieures – juste en dessous du tarse (C)

- Avec votre animal assis ou allongé, localisez la zone juste au-dessus du coussin central sous l'une des pattes arrière.
- Placez votre index et votre majeur dans cette zone et cherchez un pouls.
- Comptez pendant 60 secondes.

Fréquence cardiaque (battements par minute)

Gardez à l'esprit que les jeunes animaux ont des battements cardiaques plus rapides que les plus âgés.

 Toutes tailles	160 à 220 BPM
 S : (<13,6 kg)	100 à 160 BPM
 M - L : (13,6 à 41 kg)	60 à 100 BPM
 XL : (>41 kg)	60 à 80 BPM

Fréquence respiratoire

 S : 20 à 30 respirations par minute	Jusqu'à 300 halètements par minute
 L : 10 à 30 respirations par minute	Jusqu'à 200 halètements par minute

Températures normales

 S :	38,1 °C – 39,1 °C
 L :	37,9 °C – 39,3 °C

MANIPULATION

Approchez-vous toujours d'un animal malade ou blessé avec prudence. Votre animal de compagnie bien-aimé peut lui aussi devenir agressif lorsqu'il est malade ou qu'il souffre. Approchez-vous lentement, baissez-vous, laissez-le sentir le dos de votre main, parlez-lui doucement et évitez d'établir un contact visuel direct.

Muselière


Pour votre sécurité, vous devez dans la mesure du possible museler votre animal malade ou blessé. Ne muselez votre animal de compagnie que si vous pouvez le faire en toute sécurité et ne recourez jamais à la contrainte ou à la force. Ne muselez jamais un animal qui vomit, tousse ou présente des difficultés à respirer.

Muselière improvisée

Si vous n'avez pas de muselière achetée en magasin, vous pouvez utiliser la sangle en nylon ou le rouleau de gaze fournis dans ce kit pour fabriquer votre propre muselière improvisée.

1. Commencez avec un matériau d'au moins 45 cm de long.
2. Faites un nœud au milieu.
3. Réalisez une boucle assez grande pour épouser le museau de l'animal (A).
4. Mettez-vous derrière l'animal et faites glisser la boucle sur son museau. *Faites en sorte que l'animal sache toujours où vous vous trouvez. Gardez une distance suffisante entre vous et la gueule de l'animal pour qu'il ne puisse pas se retourner et vous mordre.
5. Resserrez la boucle, en veillant à ne pas gêner sa respiration (B).
6. Placez les extrémités du tissu de chaque côté de sa face et croisez-les au niveau de sa gorge. Ramenez ensuite les extrémités derrière les oreilles (C).
7. Pour les chats et les chiens à museau court ; prenez une extrémité, passez-la sous la boucle sur le museau et attachez-la à l'autre extrémité autour du cou. Pour tous les autres chiens, attachez les extrémités en formant un nœud derrière les oreilles (D).

Comment fabriquer une muselière de fortune



Transport

Le déplacement d'un animal blessé doit s'effectuer avec précaution pour éviter d'aggraver le problème ou la douleur. En règle générale, les animaux de compagnie blessés ne doivent pas rester dans vos bras, car vous risquez de les bousculer ou de leur causer des problèmes respiratoires.

Pour les blessures plus graves :

- Soutenez le dos de votre animal.
- Faites reposer les pattes cassées sur un support.
- Pour une blessure au thorax, positionnez votre animal de manière à ce que son poumon blessé repose sur le siège ou la planche de transport et son poumon non blessé (ou moins blessé) soit tourné vers le haut pour faciliter sa respiration.

Laissez votre animal de compagnie trouver lui-même sa position la plus confortable.


Les trois méthodes les plus sûres pour transporter votre animal de compagnie :



Sac de transport



Planche plane



Civière

TECHNIQUES

RCR

N'effectuez la RCR que si votre animal ne respire pas ! N'essayez pas sur un animal conscient. Suivez l'ordre ABC (voies respiratoires, respiration, circulation) lors de l'exécution de la RCR.

A=voies respiratoire

- Couchez l'animal sur le côté. Libérez ses voies respiratoires en étendant doucement sa tête et son cou et en poussant son museau vers l'arrière jusqu'à ce que le cou soit droit.

- Ouvrez la gueule et tirez la langue. Dégagez les débris si nécessaire.

B=respiration

Utilisez les fréquences respiratoires suivantes :

 **S** : 20 à 30 respirations par minute

 **L** : 10 à 20 respirations par minute

- Fermez la gueule de votre animal.
- Placez votre bouche sur le museau de votre animal et soufflez de manière suffisante pour faire monter le thorax.
- Répétez quatre ou cinq fois, puis vérifiez si votre animal commence à respirer tout seul.
- Si l'animal ne respire pas ou si sa respiration est superficielle, continuez la respiration assistée pendant 20 minutes maximum.
- En l'absence de pouls ou de rythme cardiaque, effectuez des compressions thoraciques et alternez avec des insufflations. Vérifiez le pouls après chaque série de compressions.



Soufflez par la bouche dans le museau de votre animal.

C=circulation

Effectuer des compressions thoraciques

Chat ou petit chien (<13,6 kg)

1. Couchez l'animal sur le flanc droit.
2. Agenouillez-vous à côté de l'animal, son thorax face à vous.
3. Placez la paume de l'une de vos mains sur les côtes à l'endroit où le coude rencontre le thorax.
4. Comprimez le thorax sur un tiers, voire la moitié de son diamètre, en vous servant de vos coudes légèrement verrouillés. Faites ceci 100 à 150 fois par minute.
5. Si deux personnes sont présentes, continuez la respiration artificielle pendant les compressions.




Placez la paume d'une de vos mains sur les côtes.

6. Dans le cas contraire, alternez 30 compressions thoraciques et deux insufflations. Vérifiez le pouls après deux minutes.

Chien moyen à grand (13,6-41 kg)

1. Couchez l'animal à votre droite.
2. Tenez-vous debout ou agenouillez-vous derrière l'animal les bras tendus et les mains en coupe.
3. Placez vos paumes sur le thorax, à l'endroit situé derrière le coude.
4. Comprimez le thorax sur un tiers, voire la moitié de son diamètre, en vous servant de vos coudes légèrement verrouillés. Faites ceci 100 à 150 fois par minute.
5. Si deux personnes sont présentes, continuez la respiration artificielle pendant les compressions.
6. Dans le cas contraire, alternez 30 compressions thoraciques et deux insufflations. Vérifiez le pouls après deux minutes.



Placez vos mains en coupe et posez les paumes sur les côtes derrière les coudes.

Chien de très grande taille (plus de 41 kg)

1. Suivez la même procédure que pour un chien de taille moyenne à grande.
2. Effectuez 10 à 15 compressions pour une insufflation.


URGENCES

Morsures

Morsure d'araignée/piqûre d'abeille

Symptômes :

- Douleur
- Rougeur et gonflement
- Démangeaisons et léchage



Traitement :

- Retirez le dard avec un objet ferme. N'essayez pas de le retirer avec vos doigts, car vous pourriez libérer plus de venin.
- Appliquez une compresse de soulagement en cas de piqûre et/ou un sac de glace fourni dans le kit pour réduire l'enflure.

- Si votre animal présente un gonflement de la face ou de l'urticaire, consultez immédiatement un vétérinaire. Si votre animal vomit ou a des difficultés à respirer, cela peut être le signe d'un choc anaphylactique (une réaction allergique grave). Cherchez de l'aide vétérinaire et préparez-vous à effectuer une RCR si le cœur s'arrête. Voir Choc à la page 17 ou RCR à la page précédente.

Morsure de serpent

Symptômes :

Plaie punctiforme qui saigne

Rougeur et gonflement

Douleur

Tremblements et écoulement salivaire

Choc

Traitement :

- Essayez d'identifier le type de serpent à une distance sûre, sans tenter de le capturer.
- Veillez à ce que votre animal reste calme et immobile.
- N'essayez pas d'aspirer le venin ou d'ouvrir la plaie.
- N'appliquez pas de glace ou de garrot sur la zone.
- Rincez la plaie à l'eau.
- Examinez les signes de choc.
- Portez votre animal de compagnie jusqu'à la voiture, car le venin risque de se répandre plus rapidement s'il bouge. Demandez immédiatement l'aide d'un vétérinaire.

Saignements

- En portant les gants en latex fournis dans le kit, maintenez une compresse de gaze sur la zone de saignement et appliquez une pression directe.
- Si le sang déborde, ajoutez une autre couche de gaze sans enlever la première. Recommencez autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Maintenez la compresse en place avec un pansement.
- Si le saignement persiste, maintenez une pression directe sur la plaie. En cas de saignement artériel (giclement), appuyez sur la zone juste au-dessus de la plaie. Pour les saignements veineux, pressez sur la zone juste en dessous de la plaie.
- En cas de saignement d'un membre, surélevez le membre au-dessus du niveau du cœur et continuez à appliquer une pression directe.

- Si la pression exercée au-dessus ou en dessous de la plaie ne parvient pas à stopper le saignement, appliquez un bandage compressif en enroulant de la gaze ou un autre matériau souple autour de la plaie et en le serrant juste assez pour arrêter le saignement. Fixez à l'aide de ruban adhésif.
- Si aucune de ces techniques ne fonctionne, consultez immédiatement un vétérinaire.

Ballonnements/torsion

En cas de ballonnements, l'estomac se remplit d'air ou de nourriture, souvent après un repas. Le ballonnement peut être suivi de près par une torsion lorsque l'estomac se retourne sur lui-même, entraînant ainsi une rupture simultanée de l'irrigation sanguine, et un choc mortel.

Symptômes :

- Abdomen gonflé
- Écoulement salivaire ou salivation
- Vomissements ou renvois
- Agitation et allure
- Choc

Traitement :

- Examinez les signes de choc et administrez une RCR si nécessaire
- Demandez immédiatement l'aide d'un vétérinaire (surtout si vous soupçonnez une torsion)

Brûlures

- Les brûlures au premier degré (légères) touchent la couche supérieure de l'épiderme et se manifestent par des zébrures rouges.
- Les brûlures au deuxième degré pénètrent plus profondément dans l'épiderme et peuvent provoquer des cloques.
- Les brûlures au troisième degré doivent toujours être traitées par un vétérinaire. Ces brûlures traversent toutes les couches de l'épiderme et pénètrent dans la chair en dessous.

Traitement :

- Rincez la zone à l'eau froide en éliminant tout débris ou produit chimique.
- N'utilisez pas de pommades, de beurre ou de vaseline sur les brûlures.
- Si plusieurs parties du corps sont brûlées, n'immergez pas votre animal. Faites couler de l'eau froide sur les zones et appliquez un tampon stérile antiadhésif sur celles-ci.

- Pour les brûlures graves ou les brûlures au premier et au second degrés couvrant une grande surface, consultez immédiatement un vétérinaire.

Étouffement

- Comme chez les humains, si votre animal commence à s'étouffer, il aura des haut-le-cœur, vomira et toussera pour essayer d'expulser l'objet.

Symptômes :

- Difficulté respiratoire
- Anxiété
- Les gencives peuvent être blanches ou bleues

Traitement :

- Ouvrez la gueule de l'animal et examinez sa cavité buccale pour voir si vous pouvez déloger l'objet (B). Faites attention de ne pas vous faire mordre ou de pousser l'objet plus loin dans la gorge. Sachez que la gorge comporte une structure rigide appelée l'appareil hyoïde. Le fait de tirer dessus pourrait occasionner de graves blessures.
- Vous pouvez aussi soulever l'animal par les pattes arrière et les maintenir verticalement, la tête orientée vers le bas (A). Cette position peut permettre de déloger l'objet.

Schémas correspondants sur la page suivante >

Si vous ne parvenez pas à extraire l'objet de cette manière, essayez ce qui suit :

- Avec l'animal en position debout ou couchée, placez vos bras autour de sa taille.
- Fermez votre poing et placez-le sous le chien, là où se terminent les côtes, juste en dessous de son sternum (C).
- Comprimez l'abdomen en poussant avec votre poing cinq fois d'affilée (similaire à la manœuvre de Heimlich). Répétez l'opération deux ou trois fois de suite, en examinant la gueule pour voir si l'objet a été délogé entre chaque série de mouvements.
- En cas d'échec, essayez d'administrer un « coup sec » avec la paume de votre main entre les omoplates de votre animal, puis recommencez les compressions abdominales (D).

- Examinez à nouveau la gueule et si l'objet n'est pas délogé, consultez immédiatement un vétérinaire. Vous devez vous tenir prêt à recommencer le traitement dans la voiture et à pratiquer la respiration artificielle si votre animal cesse de respirer. Voir la section RCR en pages 7-9.

Plusieurs façons d'aider un animal qui s'étouffe :




A

Tête tournée vers le bas comme une brouette.



B

Examinez la cavité buccale pour voir si vous pouvez déloger l'objet.



C

Comprimez l'abdomen en poussant vers le haut avec votre poing.



D

Un « coup sec » entre les omoplates de votre animal peut faire l'affaire.

Déshydratation

Symptômes :

- Yeux enfoncés
- Gencives pâles ou sèches
- Faiblesse ou léthargie

Traitement :

- Les chiens et les chats ont une peau lâche à l'arrière du cou (du haut de la tête à la base du cou) qui est facile à saisir.
- Pour déterminer si votre animal est déshydraté, tirez sur la peau derrière le cou. Elle devrait revenir à la normale en moins d'une seconde. Sinon, l'animal est déshydraté.
- Si votre animal ne vomit pas, donnez-lui de l'eau et si son état ne s'améliore pas au bout de quelques heures ou s'accompagne de fièvre ou d'une température corporelle basse, consultez immédiatement un vétérinaire.

Engelures

Les engelures peuvent être difficiles à reconnaître chez votre animal de compagnie à cause de sa fourrure. Les endroits les plus courants pour les engelures sont la queue, le bout des oreilles et les coussinets des pattes.

Symptômes :

- Absence de douleur ou de sensation dans la zone touchée
- Décoloration de la zone touchée
- La zone peut sembler gelée
- L'animal peut être mou

Traitement :

- Commencez par sortir votre animal du froid.
- Réchauffez doucement et lentement la zone touchée, en commençant par de l'eau froide puis en passant à l'eau chaude. N'exercez pas de pression sur la zone et ne la frottez pas.
- Demandez immédiatement l'aide d'un vétérinaire, car la zone touchée peut avoir subi des dommages permanents.

Coup de chaleur

Ne laissez jamais votre animal de compagnie dans une voiture garée en pleine chaleur et surveillez les signes de surexcitation.

Symptômes :

- Température corporelle à 40 °C ou plus
- Halètement excessif Incapacité de bouger
- Langue ou gencives rouge vif
- Diarrhée sanglante

Traitement :

- Éloignez votre animal de la chaleur et placez-le dans un endroit frais.
- Vérifiez la température de votre animal. Voir la section Températures normales page 5.
- Brumisez votre animal avec de l'eau fraîche ou placez-le dans un bain frais. Reprenez sa température. Vous pouvez également essayer de placer des serviettes imbibées d'eau sur la tête, le cou, les pattes et/ou l'abdomen.
- Recommencez jusqu'à ce que la température normale soit rétablie et que votre animal soit mieux hydraté. Pour plus d'informations sur l'administration du test de déshydratation à votre animal, reportez-vous à la page précédente.

- Une fois qu'une température de 40 °C est atteinte, arrêtez le processus de refroidissement et consultez immédiatement un vétérinaire. De nombreuses conséquences du coup de chaleur ne seront pas perceptibles avant quelques jours. Si une température de 40 °C n'est pas atteinte dans un délai de 10 à 15 minutes, consultez immédiatement un vétérinaire.

Hypothermie

L'hypothermie correspond à une forte réduction de la température corporelle pouvant entraîner de graves problèmes de santé.


Symptômes :

- Températures inférieures à 37,8 °C
- Frissons
- Pouls faible
- Gencives pâles ou bleuies

Traitement :

- Mettez votre animal à l'intérieur et prenez sa température. Voir la section Températures normales page 5.
- Enveloppez-le dans des couvertures chaudes ou dans la couverture d'urgence fournie dans le kit. Posez une bouteille d'eau chaude à côté de lui ou sur les couvertures.
- Examinez les signes de choc.
- Revérifiez sa température de temps en temps jusqu'à ce que la température normale soit atteinte.
- Consultez votre vétérinaire dès que possible.
- Si vous ne parvenez pas à restaurer la température normale de votre animal, consultez immédiatement un vétérinaire.

Ce que suggère la température corporelle de votre animal :



Blessure

Les blessures peuvent aller d'une simple entorse et foulure à des blessures plus graves telles qu'une fracture de la patte ou une luxation de l'articulation. Commencez par calmer votre animal pour essayer de diagnostiquer la blessure.

Entorses et foulures

Une blessure au muscle.

Symptômes :

- Claudication
- Gonflement
- Douleur

Traitement :

- Avec votre animal couché, couvrez le membre blessé avec une serviette et appliquez un sac de glace au-dessus.
- Faites cela 3 à 4 fois par jour, pendant 5 à 15 minutes à la fois. Après les 24 premières heures, passez du refroidissement de la blessure aux compresses chaudes. Appliquez-les de la même façon que le pack de glace.
- Ne reprenez pas les activités physiques tant que la blessure n'est pas guérie.
- S'il n'y a pas d'amélioration ou si la blessure s'aggrave dans les 24 heures, consultez immédiatement un vétérinaire.

Fractures osseuses

Une cassure dans l'os.

Symptômes :

- Douleur
- Défiguration et/ou fracture ouverte
- Claudication
- Gonflement

Traitement :

- Pour toutes les fractures, surveillez le choc et administrez la RCR au besoin. Pour plus d'informations voir page 17 sur le choc, et page 7-9 sur la RCR.
- Gardez l'animal calme.
- Couvrez la plaie sans la serrer, avec une gaze ou un tampon stérile et du ruban adhésif.
- Évitez de poser une attelle à moins d'être correctement formé à cette pratique.
- Demandez immédiatement l'aide d'un vétérinaire.

Luxation articulaire

Les deux articulations les plus souvent luxées (os hors de l'articulation) sont celles des coudes et des hanches de votre animal.

Symptômes :

- Douleur lorsque la zone concernée est touchée

- Le pied ne touche pas le sol
- Si la hanche est touchée : la patte postérieure luxée peut être plus courte ou plus longue que l'autre
- Si le coude est touché : Le coude luxé peut être plié et le bas de la patte peut être pointé vers l'avant ou à distance du corps

Traitement :

- Examinez votre animal pour voir s'il présente des signes de choc, administrez la RCR si nécessaire.
- Évitez de poser une attelle à moins d'être correctement formé.
- Consultez votre vétérinaire dès que possible.

Empoisonnement

Tout d'abord, appelez votre vétérinaire ou le Centre National d'Information Toxicologiques Vétérinaires au 04 78 87 10 40 pour obtenir plus d'informations sur le poison spécifique concerné. Si vous savez quel était le poison, apportez le vomi, le poison ou le récipient dans lequel se trouvait le poison chez le vétérinaire.

Traitement contre les poisons ingérés :

- Appelez immédiatement votre vétérinaire et ne faites pas vomir votre animal à moins d'y être invité.

Traitement contre les poisons inhalés :

- Amenez immédiatement votre animal en plein air.
- Surveillez un éventuel état de choc et administrez la RCR si nécessaire. Voir la page suivante pour plus d'informations sur le choc, et les pages 7 à 9 pour la RCR.

Traitement topique des poisons :

- Identifiez rapidement la toxine topique. Pour les toxines à base d'eau, utilisez un liquide vaisselle doux et rincez abondamment. Répétez si nécessaire jusqu'à ce que tout le poison topique soit éliminé. Pour les toxines à base d'huile, appliquez d'abord du beurre, du beurre d'arachide, de la mayonnaise ou du dégraissant pour les mains de mécanicien. Ensuite, lavez avec du savon à vaisselle doux comme ci-dessus.
- Si le poison se trouve dans les yeux, rincez-les à l'eau ou avec un collyre stérile.
- Si le poison est une poudre, effectuez un dépoussiérage ou aspirez-le.



Choc

- Le choc est une maladie potentiellement mortelle qui survient lorsque le corps ne reçoit pas assez d'oxygène. Il existe trois étapes de choc, énumérées ci-dessous :

Symptômes de choc léger

- Température corporelle faible. Voir les niveaux de température corporelle en page 5
- Augmentation de la fréquence cardiaque et du pouls. Voir la section Fréquences cardiaques page 5
- Les gencives peuvent avoir une apparence rose foncé ou rouge

Symptômes de choc sévère

- Hypothermie (corps bas tempéré)
- Fréquence cardiaque encore plus élevée, mais pouls plus faible
- Les gencives peuvent paraître blanches
- Membres frais

Symptômes de choc terminal :

- Rythme cardiaque lent. Voir la section Fréquences respiratoires normales page 5
- Semi-conscience ou inconscience
- Pouls faible ou absent

Traitement de choc :

- Si votre animal saigne, voir Saignement page 10
- Administrez la RCR au besoin
- Enveloppez l'animal avec la couverture thermique fournie dans le kit, ou dans une serviette
- Demandez immédiatement l'aide d'un vétérinaire. Le choc peut être fatal

Blessure traumatique

- Cherchez toujours une aide vétérinaire immédiate en cas de blessure traumatique.

Symptômes de dos fracturé :

- Douleur intense
- Incapacité de bouger
- Déformation vertébrale évidente
- Anus ouvert
- Écoulement d'urine ou de matières fécales


Traitement du dos fracturé :

- Essayez de calmer votre animal pour stabiliser sa respiration.
- Si l'animal est inconscient, administrez la RCR au besoin. Voir la section RCR en pages 7-9.
- Placez une planche rigide ou une surface en plastique dur sur le côté le long du dos de l'animal.
- Glissez la planche sous votre animal en le maintenant aussi immobile que possible.
- Enveloppez la planche et l'animal avec des draps ou des couvertures.
- Enroulez du ruban adhésif, du tissu ou de la corde autour de la planche et de l'animal pour les maintenir serrés et sécurisés.
- Demandez immédiatement l'aide d'un vétérinaire.

Accident de voiture

- Si vous avez été témoin de l'événement, essayez de noter mentalement l'endroit où votre animal a été percuté et si l'animal a simplement été touché, projeté ou écrasé.

Essayez de garder le corps aussi immobile que possible



- Approchez-vous prudemment du lieu de l'accident.
- Alerte le trafic venant en sens inverse en agitant vos mains ou une serviette.
- Si la circulation ne s'est pas arrêtée, déplacez prudemment votre animal sur le côté de la route en le tirant par la fourrure sur le dessus du corps, et en essayant de garder le corps aussi immobile que possible. Votre animal peut avoir peur ou avoir mal, alors assurez-vous qu'il ne peut pas vous mordre, en utilisant une muselière si nécessaire. Voir Muselière improvisée en page 6.
- Vérifiez les signes vitaux de votre animal : respiration, rythme cardiaque et pouls. Administrez la RCR au besoin.
- Notez les informations importantes suivantes pour le vétérinaire : position de l'animal ; présence de sang, d'urine ou d'excréments.
- Si l'animal ne peut pas se déplacer, suivez les instructions de premiers secours relatives aux fractures du dos, afin de le transporter.

- Vérifiez les plaies ouvertes et les atteintes aux membres. Si votre animal peut se tenir debout, notez s'il boite ou s'il se sent plus à l'aise d'un côté.
- Si votre animal saigne, consultez les instructions de premiers secours relatives aux saignements à la page 10.
- Examinez les signes de choc. Voir la section Choc à la page 18.
- Demandez immédiatement l'aide d'un vétérinaire. Certaines blessures traumatiques ne se révèlent que 48 à 72 heures après un accident.

INFORMATIONS D'URGENCE

Nom de l'animal

Votre nom

Adresse

.....

.....

Numéro de téléphone

Vétérinaire

Adresse

.....

.....

Numéro de téléphone

Allergies

.....

.....

.....

.....

Autres notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTES

Centre National d'Information
Toxicologiques Vétérinaires (CMITV) 04 78 87 10 40

Pour les urgences en dehors des heures
d'ouverture, veuillez appeler votre centre
d'urgence local. Écrivez leur numéro de
téléphone ici pour pouvoir vous y référer
facilement. _____

Identification des carnivores domestiques (I-CAD)
Pour signaler un animal de compagnie disparu
avec un tatouage enregistré ou une micropuce. 08 10 77 87 78

Société Protectrice des Animaux (SPA)
Pour signaler la maltraitance animale. 01 43 80 40 66